

公告事項：新增檢驗項目  
Molecular examination of HSV 1/2 virus  
單純皰疹病毒分子檢測

## 介紹

單純皰疹病毒為雙股 DNA 病毒，生殖器皰疹是由 HSV-1 和 HSV-2 引起的一種性傳染疾病。透過分泌物的接觸而發生初次感染後，病毒會終生存在於體內，病毒可以潛伏在體內一段時間或再次被活化而引起有症狀的疾病復發。

單純皰疹病毒的垂直感染(母體於孕期或周產期將 HSV 傳染給嬰兒)可以造成新生兒嚴重的疾病或死亡。

## 檢驗方法

Real-Time Polymerase Chain Reaction

試藥廠牌及儀器：Roche Cobas 4800

## 生物參考區間

HSV 1 DNA：Negative

HSV 2 DNA：Negative

## 臨床意義

單純皰疹病毒在性接觸 4 至 7 天後會出現局部疼痛或刺痛，接著在外生殖器上出現兩側性成簇的紅色丘疹和水泡；病灶也可出現在肛週部位。可能會同時出現發燒、頭痛、倦怠及腹股溝淋巴結腫大。

大部份的生殖器皰疹是由 HSV-2 引起的。HSV-1 也可引起生殖器皰疹，但它通常引起口腔和唇部的感染。生殖器皰疹的傳染通常是源自不知道自己已被感染的個體或那些無症狀的感染者。

## 承辦人員

技術主管：賴孟君 分機 1404

品質主管：余佩玲 分機 1402

技術長：徐仁杰 分機 1401

業務主管：陳德卿 分機 1301

## 採檢須知：

- 以 MSwab 採集肛門生殖器檢體。
- 發病（出現皮疹症狀）後 3-7 天內採集。
- 採檢前不可塗抹 Vagisil Crème 軟膏。
- HSV 檢體避免帶有血色或褐色易產生偽陰性結果。

## 檢體種類：

Cobas 專用 HSV 採檢套組 (MSwab)。

## 檢體保存：

採集後 2-8°C 14 天

## 檢體運送：

冷藏 <15°C 運送。

## 報告時效：

3 天。

## 自費價：

定價：1200 元

## 健保碼：

12182C

立人醫事檢驗所  
JY01010089

-謹此敬告通知-